



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Προς τους
Προέδρους των
Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Αθήνα 31/7/2012
Αριθμ. Πρωτ. 1554

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε το εξής έγγραφο:

1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γενική Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, Δ/ση Φαρμάκου, Τμήμα Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων, με αρ. πρωτ. 33831/30.7.2012 με θέμα: "Χορήγηση καλσιτονίνης"

με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για τον Π.Ι.Σ.
Ερμάνουηλ Ηλιάκης
Προϊστάμενος Διοικ. Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ • 106 75 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 7258660, 210 7258661, 210 7258662, FAX: 210 7258663
 PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION • 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 106 75 ATHENS • HELLAS
 www.pis.gr • e-mails: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: pisinfo@pis.gr • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: pis@pis.gr • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: pisref@pis.gr
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: pislog@pis.gr • ΔΙΕΘΝΕΣ: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: pismember@pis.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr

ΑΔΑ: Β41ΝΟΞ7Μ-1ΝΛ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 30/07/2012

Αρ. Πρωτ.: 33831

Γενική Δ/ση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών υγείας
Δ/ση: Φαρμάκων
Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης
Ελέγχων
Πληροφορίες: Β. Κουράφαλος
Τηλ.: 2106871755 Fax: 2106871792
Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Προς: 1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ
2. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
3. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος



ΘΕΜΑ: «Χορήγηση καλσιτονίνης».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, επιστάται η προσοχή των ιατρών στη χορήγηση του φαρμάκου καλσιτονίνη.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστά τον περιορισμό της μακροχρόνιας χρήσης φαρμάκων που περιέχουν καλσιτονίνη.

Οι γιατροί δεν θα πρέπει να συνταγογραφούν φάρμακα που περιέχουν καλσιτονίνη σε ρινικό εκνέφωμα για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν καλσιτονίνη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομης διάρκειας θεραπεία, λόγω ενδείξεων ότι η μακροχρόνια χρήση αυτών των φαρμάκων συσχετίζεται με έναν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Η καλσιτονίνη θα είναι διαθέσιμη μόνο ως διάλυμα για ένεση και έγχυση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για:

- Πρόληψη της οξείας απώλειας οστικής μάζας εξαιτίας αιφνίδιας ακινητοποίησης, με σύσταση για θεραπεία δύο εβδομάδων με μέγιστη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων.
- **Νόσο Paget** σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε εναλλακτικές θεραπείες ή για εκείνους στους οποίους τέτοιες θεραπείες δεν είναι κατάλληλες, με θεραπεία που θα περιορίζεται στους τρεις μήνες.
- Υπερασβεταμία που προκαλείται από καρκίνο

Η θεραπεία με καλσιτονίνη θα πρέπει να περιορίζεται στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιώντας η ελάχιστη αποτελεσματική δόση.

ΑΔΑ: Β41ΝΟΞ7Μ-1ΝΛ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από το site του ΕΟΦ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Οι κ.κ. Διευθυντές των Μονάδων Υγείας και Π.Υ.Υ. παρακαλούνται να φροντίσουν για την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους και τους συμβεβλημένους ιατρούς της περιοχής τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γρ. Προέδρου
2. Γρ. Αντιπροέδρου κ. Νικόλη
3. Γρ. Αντιπροέδρου κ. Σουλιώτη
4. Γρ. Γενικού Διευθυντή κ. Καρβουνά
5. ΥΠΕΔΥΦΚΑ, Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
6. ΚΜΕΣ, Πειραιώς 181, 11853 Αθήνα
7. ΗΔΙΚΑ Α. Συγγρού 101 & Λαγονμιτζή 40, 11745 Αθήνα